

# DiclodeX 50 mg

Diclofenac Potásico

**COMPOSICIÓN:** Cada tableta contiene:

Cada Tableta recubierta contiene:

Diclofenac Potásico.....50 mg

Excipiente c.s.p.....1 tableta

**PROPIEDADES:**

Actúa inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, éstas desempeñan una acción importante respecto de la aparición de la inflamación, dolor y fiebre, la hialuronidasa producida por gérmenes y la agregación plaquetaria.

**INDICACIONES:**

Tratamiento sintomático de la migraña con o sin aura. Tratamiento sintomático de la dismenorrea primaria. Tratamiento de la fiebre.

**POSOLÓGIA:**

Tratamiento de la migraña: 50 mg dosis única.

Dosis máxima: 100 mg

Tratamiento de la dismenorrea: 75 – 150 mg cada 8 a 12 horas.

Tratamiento de la fiebre: 25 -50 mg VO cada 6

a 8 horas. Dosis máxima: 200 mg / día.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**ADVERTENCIAS:**

No se administre durante el embarazo o cuando se sospeche su existencia, ni durante la lactancia, a menos que a criterio médico el balance riesgo/beneficio sea favorable.

De ser imprescindible su uso por no existir otra alternativa terapéutica suspéndase temporalmente la lactancia materna mientras dure el tratamiento.

**PRECAUCIONES:**

Su administración por cualquier vía debe ser restringida en pacientes con enfermedad del tracto digestivo, si es indispensable su uso el médico tratante debe tomar todas las medidas para proteger la vía digestiva contra la posibilidad de recidivas de infecciones gastrointestinales.

Síntomas / historial de enfermedad GI, asma, disfunción renal, hepática o cardíaca. Los AINES

pueden enmascarar o inhibir temporalmente la agregación plaquetaria. Pacientes con edad avanzada. Depleción del volumen extracelular.

Los trastornos del SNC pueden influir sobre la capacidad de conducir vehículos o manejar maquinarias.

Realizar control hematológico, del funcionalismo hepático y renal. Debe ajustarse la dosis en ancianos.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula y a otros AINES.

Úlcera gastroduodenal e insuficiencia hepática o renal.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Gastrointestinales: Dispepsia, náuseas, vómitos, pirosis, flatulencia, diarrea, úlcera gástrica.

Hematológicas: Anemia aplásica y hemolítica, agranulocitosis y trombocitopenia.

Neurológicas: Cefalea y vértigo.

Otras: Erupciones cutáneas y prurito.

**INTERACCIONES:**

Litio, digoxina, metrotexate, ciclosporina, diuréticos, anticoagulantes, hipoglucemiantes orales y quinolonas.

**ALMACENAMIENTO:**

Consérvese en lugar seco y protegido de la luz a temperatura inferior a 30°C.

**PRESENTACIÓN:**

Blister de Aluminio en estuche de cartón.

**Manténgase fuera del alcance de los niños.**

**Farmacéutico Patrocinante:** Dra. Yngris K. Ledezma.

Aprobado en el M.P.P.S. Bajo el N° E:F 36.464/21

Con prescripción facultativa.

**Elaborado por:**

Laboratorios PlusAndex de Farmacéuticos Unidos;

PlusAndex C.A. El Vigía, Edo. Mérida.

Rif: J-30791317-7.