

Sildex 50 mg

Sildenafil 50 mg

Composición: Cada Tableta Recubierta contiene:

Sildenafil Citrato (equivalente a 50 mg de Sildenafil)..... 70,24 mg
Excipientes C.S.

Propiedades:

El Citrato de Sildenafil es un moderno agente terapéutico para la disfunción eréctil masculina, activo por vía oral. El fármaco actúa activando una enzima, que aumenta la concentración de cGMP que al relajar el músculo liso del cuerpo cavernoso permite el ingreso de la sangre, ahora bien no produce acción relajante directa sobre el cuerpo cavernoso humano aislado ni efecto en ausencia de estímulo sexual.

Indicaciones:

Tratamiento de la disfunción eréctil de cualquier etiología.

Vía de Administración: Oral

Posología:

Adultos: 25 a 100 mg/día

Ancianos: 25- 50 mg/día

Modo de Uso:

Debe administrarse 1 hora antes del coito, aunque puede darse entre 1/2 hora y 4 horas antes de la actividad sexual.

Advertencias:

- Previo a la administración del producto debe realizarse una evaluación integral del paciente para determinar la causa de la disfunción eréctil.
- Su indicación en pacientes cardiopatas debe ser basada en el balance objetivo del beneficio / riesgo.
- En pacientes geriátricos el tratamiento inicial debe ser con la dosis mínima recomendada.
- Su uso concomitante con fármacos a base de dadores de oxido nítrico o nitratos produce hipotensión severa y shock.
- Si se produce disminución o pérdida repentina de la visión con el uso de este producto, suspéndalo de inmediato y consulte al medico.
- Producto de uso delicado que debe ser administrado bajo estricta vigilanciamédica.
- No exceda la dosis prescrita.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Precauciones:

- Deberá determinarse antes de iniciar el tratamiento de la disfunción eréctil el estado cardiovascular del paciente.
- Se debe administrar con precaución en pacientes con patologías hemorrágicas y enfermedad ulcerosa gastrointestinal; también a pacientes con insuficiencia hepática o renal severa.
- No se aconseja su combinación con otros fármacos destinados al tratamiento de la disfunción sexual en sujetos con deformidades anatómicas penianas o patologías que predisponen a leucemias, mielomas y anemia de células falciformes.

Contraindicaciones:

- Alergia a los componentes de la fórmula.
- Pacientes bajo tratamiento con medicamentos que contengan mononitrato y dinitrato de Isorbide o parches de nitroglicerina.
- Insuficiencia Hepática y/o renal.
- Retinitis pigmentaria hereditaria.

Reacciones Adversas:

Con una incidencia menor o igual al 2% se registraron: cefalea, rubor facial, congestión nasal, diarrea, dispepsia, mialgias, atralgias, visión anormal (alteración leve en la diferenciación de los colores azul/verde), fotofobia y visión borrosa.

Interacciones:

- No se debe administrar de manera concomitante con nitratos o donadores
- de óxido nítrico ni con las sustancias mononitrato y dinitrato de isosorbide.
- Cimetidina, Eritromicina y Ketoconazol pueden aumentar los niveles
- plasmáticos de Sildenafil.

Sobredosis:

En casos de sobredosificación se adoptarán las medidas de sostén de aplicación habitual. La diálisis renal no acelera ni modifica la eliminación del fármaco.

Almacenamiento:

Consérvese a temperatura inferior a 30°C

Presentaciones:

Blister x 4 tabletas / x 2 tabletas / x 1 tableta en estuche de cartón